

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู Development of Bird Chilli Flavoured Palaw Keropok

วิภาดา มุรินทร์นพมาศ^{1*} ซูไรดา วายุ¹ และ สุไฮลา วาเตะ¹
Wipada Muninnopamas^{1*}, Suraida Wayu¹ and Suhaila Wate¹

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยทำการศึกษาระดับความแก่ของพริกชี้หนู 3 ลักษณะ คือ พริกชี้หนูสีเขียว พริกชี้หนูสีแดง และพริกชี้หนูสีเขียวผสมพริกชี้หนูสีแดงอัตราส่วน 1:1 พบว่า หัวข้าวเกรียบปลาที่มีส่วนผสมของพริกชี้หนูสีเขียวผสมพริกชี้หนูสีแดงมีคะแนนความชอบรวมสูงสุด ($P < 0.05$) ส่วนการศึกษาปริมาณพริกชี้หนูในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่ร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด พบว่า หัวข้าวเกรียบปลาที่มีส่วนผสมของพริกชี้หนুর้อยละ 3 มีคะแนนความชอบสูงสุด ($P < 0.05$) และผลของการเติมพริกชี้หนูในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาในระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อค่าการพองตัว และการขยายตัวด้านยาว ($P \geq 0.05$) แต่มีผลต่อค่าการขยายตัวด้านกว้าง ($P < 0.05$) ส่วนผลของปริมาณพริกชี้หนูต่อค่าสี พบว่า มีผลต่อค่า L^* ของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาก่อนทอด ($P < 0.05$) แต่ไม่มีผลในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาหลังทอด ($P \geq 0.05$) ส่วนค่า a^* พบว่า ปริมาณพริกชี้หนูไม่มีผลต่อค่า a^* ทั้งในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาก่อนและหลังทอด ($P \geq 0.05$) แต่มีผลต่อค่า b^* ในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาทั้งก่อนและหลังทอด ($P < 0.05$) การศึกษาลักษณะรูปร่างของชิ้นพริกชี้หนูในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลา 3 ลักษณะ คือ แบบบดละเอียด แบบหั่นเป็นแว่นและแบบหั่นเป็นเส้น พบว่า ลักษณะรูปร่างของชิ้นพริกชี้หนูทำให้ผลิตภัณฑ์มีลำดับความชอบทางประสาทสัมผัสที่ไม่แตกต่างกัน ($P \geq 0.05$) แต่มีแนวโน้มว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมพริกชี้หนูที่หั่นเป็นแว่นจะได้รับคะแนนความชอบสูงสุด คุณลักษณะของหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูสูตรพัฒนา พบว่า มีค่าแรงเคี้ยวเท่ากับ 4,064 กรัม ปริมาณความชื้น โปรตีนไขมัน เถ้าและเยื่อใยร้อยละ 34.69 15.21 7.67 3.14 และ 6.64 ตามลำดับ และปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 872.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมการสำรวจการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปจำนวน 200 คน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมากที่สุด และมีคะแนนความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.70 ± 1.05

คำสำคัญ: หัวข้าวเกรียบ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, พริกชี้หนู

¹ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

¹ Science and Food Technology Program, Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University, 133 Sateng, Muang, Yala 95000, Thailand.

* ผู้นิพนธ์ประสานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): wipada.m@yru.ac.th

ABSTRACT

The objective of the research was to develop the bird chilli flavoured of Palaw Keropok accepted by consumers. The ripening of bird chilli in three forms (green bird chilli, red bird chilli and mixture of green and red bird chilli with ratio of 1:1) was studied. The result indicated that the Palaw Keropok with mixture of green and red bird chilli obtained the highest acceptance scores. The amount of chilli in the product at 2, 2.5, 3, 3.5 and 4 of total weight of the Palaw Keropok was performed. The bird chilli with the percentage of 3 of total weight obtained the highest acceptance scores. Addition of bird chilli into the Palaw Keropok at various levels did not affect on inflation and length expansion of the product ($p \geq 0.05$) but had effect on the width extension ($p \geq 0.05$). Furthermore bird chilli contents affected on the L^* value of the Palaw Keropok before frying ($p < 0.05$) but no effect on L^* value ($p \geq 0.05$) after frying. However, the bird chilli levels did not affect on the a^* value was observed of the product both before and after frying ($p \geq 0.05$). Effect to the b^* value both before and after frying the product at the significant value ($p < 0.05$). The study of bird chili shapes in the Palaw Keropok (blend, slice 0.5 cm. diameter and 0.3 cm thickness) and strip (0.2 cm. width and 1.5 cm. length) indicated that the shapes of bird chilli had no effect on acceptance scores of the product ($p \geq 0.05$) but the acceptance scores of the product with sliced bird chilli trending to obtained the highest score. The developed bird chilli Palaw Keropok contained 34.69% moisture, 15.21% protein, 7.67% fat, 3.14% ash, 6.64% fiber, 872.10 milligrams/kilograms calcium and Shear force with value of 4,064 grams. According to the consumer acceptance test ($n=200$) revealed that 87 % of consumers rated the product ranged from “like moderately” to “like extremity” with the average score of 7.70 ± 1.05 .

Key words: Palaw Keropok, product development, Bird Chilli

บทนำ

ปลาอกรือโป๊ะ (Polow Keropok) หรือที่เรียกภาษาไทยว่า หัวข้าวเกรียบปลา เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมบริโภคกันมากในพื้นที่ชายแดนใต้ ผลิตภัณฑ์หลักคือปลาที่ตัดเอาหัวและเครื่องในออก จากนั้นนำมาบดจนละเอียด แล้วนวดผสมกับส่วนผสมของอื่นๆ ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาชู และสาร

ปรุงแต่งกลิ่นรส จนเป็นเนื้อเดียวกัน ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วคลึงเป็นท่อนขนาดกว้าง \times ยาวประมาณ 5×30 เซนติเมตร จากนั้นหั่นเป็นชิ้นๆ มีความหนาประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร โดยไม่ต้องนำไปผ่านกรรมวิธีการทำให้แห้ง เมื่อจะรับประทานจึงทำให้สุกโดยการทอดในน้ำมันร้อน นานถึง 1 - 2 นาที แล้วนำมารับประทานพร้อมน้ำจิ้ม ส่วนผสมของหัวข้าวเกรียบปลาประกอบด้วยปลา

ประมาณร้อยละ 60 แป้งสาкупประมาณร้อยละ 30 และแป้งมันสำปะหลังประมาณร้อยละ 25 (Mohamed *et al.*, 2008) ซึ่งจะเห็นได้ว่าหัวข้าวเกรียบปลามีส่วนผสมของโปรตีนและแคลเซียมสูงมาก เนื่องจากใช้ปลาพร้อมทั้งกระดูกถึงร้อยละ 60 ในขณะที่หัวข้าวเกรียบปลาโดยทั่วไปเติมเนื้อปลาในช่วงร้อยละ 20 - 25 และเป็นเนื้อปลาที่ไม่มีก้างเป็นส่วนผสม หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมปลาร้อยละ 35 ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโปรตีนเพียงร้อยละ 7.42 (เพลินใจ, 2546) หัวข้าวเกรียบปลาโดยทั่วไปไม่สามารถเติมโปรตีนจากเนื้อปลาในปริมาณสูงได้ เนื่องจากโปรตีนจากเนื้อปลายับยั้งการพองตัวของหัวข้าวเกรียบ (Yu *et al.*, 1981) และผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบทั่วไปต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการพองตัว เนื้อสัมผัสเป็นรูพรุน กรอบ และความหนาแน่นต่ำ (Martz, 1984) ในขณะที่หัวข้าวเกรียบปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะฟูกรอบน้อยกว่ามาก จึงสามารถเติมเนื้อปลาได้สูงกว่าหัวข้าวเกรียบปลาทั่วไปได้กว่า 2 เท่าตัว จึงนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริโภคกันมากกว่าหัวข้าวเกรียบปลาปกติที่บริโภคกันทั่วประเทศในปัจจุบันเขตเทศบาลนครยะลา มีผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาปริมาณมาก และการสำรวจรสชาติของหัวข้าวเกรียบปลา ณ ร้านจำหน่ายหัวข้าวเกรียบปลาปลีกในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 600 คน พบว่า รสชาติของหัวข้าวเกรียบปลาที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด 10 อันดับ ซึ่งมีลำดับความชอบจากมากไปน้อย ได้แก่ กระเทียม พริกไทยดำ สาหร่าย พริกชี้หนู พริกหวาน เห็ดหอม ฟักทอง ตำลึงพริกหยวก งาดำ และผักหวาน ตามลำดับ จากนั้นนำมาให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า รสชาติหัวข้าวเกรียบปลาที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด คือ รสกระเทียม พริกไทยดำ พริกหวาน สาหร่าย พริกชี้หนู และตำลึง ตามลำดับ และได้มีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาไปแล้ว 3 รสชาติ คือ รสกระเทียม พริกไทยดำ พริกหวานและสาหร่าย (วิภาดา และ ภารดี, 2554) ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งพริกชี้หนูเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าเนื่องจากประกอบด้วยสารที่ทำให้ความเผ็ด คือแคปไซซิน (Capsaicin) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมไขมัน ช่วยเร่งเมตาบอลิซึมและสันดาปในร่างกาย ทำให้น้ำหนักลดลง และช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด เมื่อรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พบว่า พริกชี้หนูมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น ใช้เป็นยาขับเสมหะ ยาขับลม แก้อาเจียน ช่วยย่อยในกรณีน้ำย่อยน้อย เพิ่มความอบอุ่นในร่างกาย รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดแก๊สที่เกิดจากการย่อยอาหาร และการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อท้องที่เกิดจากท้องอืด ท้องเฟ้อด้วย นอกจากนี้พริกยังใช้ป้องกันไข้หวัดได้ อาจเป็นเพราะว่าพริกอุดมไปด้วย Beta-carotene, Bioflavonoid และวิตามินซี (พัชรินทร์, 2547) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูจนได้สูตรพัฒนาที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แล้วนำไปให้ผู้ประกอบการทำการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ นับเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสนับสนุนอาชีพของชาวประมงที่เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของประชากรใน 3 จังหวัดได้เป็นอย่างดี

วัสดุและวิธีการทดลอง

วัตถุดิบ

1. ปลายูแซกกรีบสันมีลักษณะสด คือ ตาใส เหงือกแดงสด เนื้อแน่นและยืดหยุ่น ผิวหนังเป็นมัน ท้องไม่แตก และไม่มึกลื่นเหนียว จากตลาดเสรี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2. แป้งมันสำปะหลัง ตราแมวแดง ดาวเทียมลูกโลก บริษัท เกียงไกรค้าแป้ง (ผู้แทนจำหน่าย) ประเทศไทย
3. น้ำมันปาล์ม ตราลีลาบริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ประเทศไทย
4. เกลือป่น ตราปรุทพิพย์บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด ประเทศไทย
5. น้ำตาลทรายขาวตราลินบริษัท ไทยรุ่งเรือง ประเทศไทย
6. ผงชูรสตราอายิโนะโมะโต๊ะบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย
7. พริกชี้หนูสวนสีแดงและสีเขียว (*Capsicum* spp.) จากตลาดเสรี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วิธีการทดลอง

1. ศึกษาระดับความแก่ของพริกชี้หนูที่เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู ทำการศึกษาระดับความแก่ของพริกชี้หนูที่

เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลา 3 ลักษณะ คือ พริกชี้หนูสีแดงพริกชี้หนูสีเขียวและพริกชี้หนูสีแดงผสมพริกชี้หนูสีเขียว อัตราส่วน 1:1 โดยเติมในปริมาณร้อยละ 3 ของส่วนผสมทั้งหมดสูตรการผลิตดังตารางที่ 1 ได้ชุดการทดลองทั้งหมด 3 ชุดการทดลอง แล้วนำผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูที่ผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผัสการยอมรับด้วยมาตราความชอบ 9 คะแนน (9-Point-Hedonic Scale) ประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏกลิ่นรส ความเค็ม และความชอบรวมวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 30 คน นำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี DMRT คัดเลือกชุดการทดลองที่มีคะแนนความชอบสูงสุดไปใช้ในข้อต่อไป

1.1 ขั้นตอนการผลิตหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

การผลิตหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- นำปลายูแซกสดจากตลาดเสรี อำเภอเมือง จังหวัดยะลามาตัดหัว ควักไส้ทิ้งแล้วล้างให้สะอาด ตั้งให้สะเด็ดน้ำ

ตารางที่ 1 สูตรหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

ส่วนผสม	ปริมาณ (ร้อยละ)
ปลายูแซก	60.00
แป้งมันสำปะหลัง	30.50
เกลือป่น	1.80
น้ำตาล	3.80
ผงชูรส	0.90
พริกชี้หนู	3.00

- นำมาบดด้วยเครื่องบด 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการบดหยาบใช้หน้าแปลนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเท่ากับ 0.5 เซนติเมตรจากนั้นทำการบดละเอียดโดยใช้หน้าแปลนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ใหละเอียด

- จากนั้นนำเนื้อปลาพร้อมก้างที่บดละเอียดแล้วใส่ในเครื่องนวดผสมแป้งที่ใช้ใบพัดแบบตะขอแล้วเติมส่วนผสมของเกลือป่นน้ำตาลและผงชูรสทำการนวดผสมเป็นเวลา 3 นาทีใช้ความเร็วระดับ 1

- เติมส่วนผสมของแป้งมันสำปะหลังและพริกชี้หนูที่ผ่านการเด็ดขั้วและล้างทำความสะอาดแล้วจึงหั่นเป็นแว่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ความหนา 0.3 เซนติเมตร) แล้วทำการนวดผสมเป็นเวลา 4 นาที 30 วินาทีที่ความเร็วระดับ 1

- นำแป้งผสมที่ได้มาชั่งน้ำหนักให้ได้ 500 กรัม คลึงเป็นก้อนกลม แล้วป็นเป็นรูปทรงกระบอกที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร

- นำไปต้มในน้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที

- วางบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ แล้วทิ้งไว้ให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง

- นำมาหั่นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมที่มีความกว้าง \times ยาว \times หนา เท่ากับ $1 \times 8 \times 1$ เซนติเมตร

- นำไปทอดในน้ำมัน ที่อุณหภูมิ 190 ± 10 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที 30 วินาที โดยใช้อัตราส่วนของน้ำมันหั่วข้าวเกรียบปลาต่อน้ำที่ทอด เท่ากับ 200 กรัม (20 ช้อน) ต่อ 500 กรัม จนได้หั่วข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภคน

2. ศึกษาปริมาณพริกชี้หนูที่เหมาะสมในการผลิตหั่วข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

ศึกษาปริมาณพริกชี้หนูที่เหมาะสมในการผลิตหั่วข้าวเกรียบปลา 5 ระดับ คือ ปริมาณร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด แล้วนำหั่วข้าวเกรียบปลาทั้ง 5 ชุดการทดลอง ดังตารางที่ 2 มาทดสอบการยอมรับด้วยมาตราความชอบ 9 คะแนน (9-Point-Hedonic Scale) โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 30 คน นำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี DMRT คัดเลือกชุดการทดลองที่มีคะแนนความชอบสูงสุดไปใช้ในข้อต่อไป ทำการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ การวัดค่าการพองตัวโดยให้หลักการแทนที่เมล็ดงาวัดค่าการขยายตัวด้านกว้างการขยายตัวด้านยาว (Nurul *et al.*, 2010) และวัดค่าสีด้วยเครื่องยี่ห้อ Hunter

ตารางที่ 2 ผลผลิตภัณฑ์หั่วข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมปริมาณพริกชี้หนูในระดับต่างๆ

ส่วนผสม	สูตรที่ 1 (ร้อยละ)	สูตรที่ 2 (ร้อยละ)	สูตรที่ 3 (ร้อยละ)	สูตรที่ 4 (ร้อยละ)	สูตรที่ 5 (ร้อยละ)
ปลาทุแฉก	61.00	60.50	60.00	59.50	59.00
แป้งมันสำปะหลัง	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
เกลือป่น	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
น้ำตาล	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
ผงชูรส	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
พริกชี้หนู	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00

Lab รุ่น color flex ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ศึกษาลักษณะรูปร่างของขึ้นพริกชี้หนูที่เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

ทำการศึกษาลักษณะรูปร่างของขึ้นพริกชี้หนูที่เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู 3 ลักษณะ คือ

- บดละเอียด
- หั่นเป็นแว่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ความหนา 0.3 เซนติเมตร
- หั่นเป็นเส้นขนาดความกว้าง 0.2 เซนติเมตร ความยาว 1.5 เซนติเมตร

นำผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูพร้อมบริโภครวมทั้ง 3 ลักษณะมาทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยผู้ทดสอบจำนวน 30 คน ด้วยวิธีการเรียงลำดับความชอบ (Ranking test) (Fisher and Yates, 1942) โดยลำดับที่ 1 หมายถึง ชอบมากที่สุด และ 3 หมายถึง ชอบน้อยที่สุด พร้อมให้เหตุผลประกอบคัดเลือกชุดการทดลองที่มีลำดับความชอบสูงสุดเป็นสูตรพัฒนานำไปใช้ในข้อต่อไป

4. ศึกษาคุณภาพเนื้อสัมผัสและคุณภาพทางเคมีของหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูสูตรพัฒนา

นำผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูสูตรพัฒนา มาทำการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัมผัสได้แก่ ค่าแรงเหนือนด้วยเครื่อง Texture Analyser ยี่ห้อ Satable Micro systeme Ltb. รุ่น TA.XT. Plus ประเทศอังกฤษ ด้วยหัวใบมีด Warner-Blaztler ระยะทางตัด 25 มิลลิเมตร ความเร็วของใบมีดขณะทดสอบ 2.0 มิลลิเมตรต่อวินาที และคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น โปรตีน เถ้า (AOAC, 1999) ไขมันเยื่อใย (AOAC, 2000) และแคลเซียม (โดยวิธี

ICP-OES) ซึ่งส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

5. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

ทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูของผู้บริโภคทั่วไป โดยใช้ผู้ทดสอบชิมทั่วไปจำนวน 200 คน สอบถามเพื่อหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคโดยใช้มาตราความชอบ 9 คะแนน (9-Point-Hedonic Scale) (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 2 = ไม่ชอบมาก 3 = ไม่ชอบปานกลาง 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย 5 = บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 6 = ชอบเล็กน้อย 7 = ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก 9 = ชอบมากที่สุด) ประเมินผลโดยการหาค่าร้อยละจากคะแนนการประเมินของผู้บริโภค

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย

1. การศึกษาระดับความแก่ของพริกชี้หนูที่เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

การศึกษาระดับความแก่ของพริกชี้หนูที่เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลา 3 ลักษณะ คือ พริกชี้หนูสีเขียว พริกชี้หนูสีแดง และพริกชี้หนูสีเขียวผสมพริกชี้หนูสีแดง อัตราส่วน 1:1 โดยเติมในปริมาณร้อยละ 3 ของส่วนผสมทั้งหมด ทำการทดสอบการยอมรับด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส ความเผ็ด เนื้อสัมผัส และความชอบรวม พบว่า ความแก่ของพริกชี้หนูมีผลต่อคะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส ความเผ็ด และความชอบรวม ($P < 0.05$) แต่ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัส ($P \geq 0.05$) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

ความแก่พริกชี้หนู	สี	ลักษณะปรากฏ	กลิ่นรส	ความเผ็ด	เนื้อสัมผัส	ความชอบรวม
สีเขียว	7.10 ^a ±0.84	7.17 ^a ±0.83	7.20 ^b ±0.96	7.37 ^b ±1.07	7.63 ^a ±0.96	7.47 ^a ±0.82
สีแดง	7.83 ^b ±0.91	7.90 ^b ±0.71	7.50 ^b ±1.04	7.40 ^b ±0.97	7.87 ^a ±0.73	7.87 ^{ab} ±0.94
สีแดง:สีเขียว (1:1)	7.67 ^b ±0.92	7.60 ^b ±0.85	8.10 ^a ±0.87	8.03 ^a ±0.81	7.93 ^a ±0.64	8.17 ^b ±0.83

หมายเหตุ ^{ab} ตัวเลขที่มีตัวอักษรกำกับแตกต่างกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)

ด้านสีและลักษณะปรากฏ พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูสีแดงมีคะแนนความชอบด้านสีและลักษณะปรากฏสูงสุด รองลงมาได้แก่ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูสีเขียวผสมพริกชี้หนูสีแดง อัตราส่วน 1:1 และผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูสีเขียว ตามลำดับ ซึ่งมีคะแนนความชอบด้านสีเป็น 7.83 7.67 และ 7.10 ตามลำดับ และคะแนนความชอบทางลักษณะปรากฏเป็น 7.90 7.60 และ 7.17 ตามลำดับ พริกชี้หนูสีแดงในหัวข้าวเกรียบปลาก่อนทอดมีสีแดงสดจากสารสีที่สำคัญในพริกสีแดงคือ แคปแซนทิน (Capsaithin) ซึ่งเป็นสารคีโตแคโรทีนอยด์ (Ketocarotenoid, C₄₀H₅₈NO₃) และยังพบสารอื่นที่มีสูตรใกล้เคียงกันได้แก่ แคปโซรูบิน (Capsorubin) เซียแซนทิน (Zeaxanthin) ลูเทอิน (Lutein) นีโอแซนทิน (Neoxanthin) ไวโอลาแซนทิน (Violaxanthin) และบีตาแคโรทีน (β-carotene) และสารประกอบแคปแซนทินบริสุทธิ์จะเป็นผลึกรูปเข็มสีแดงเข้ม ละลายได้ในแอลกอฮอล์ มีจุดหลอมเหลว 175 - 176 องศาเซลเซียส (จงรักษ์, 2556; อัจฉรา, 2548; พัทธรินทร์, 2547) เมื่อนำไปผ่านการทอดพริกสีแดงสดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลแดงที่เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) (Bouchon et al., 2001) แต่ยังมีสีสันสดและดึงดูดใจผู้บริโภคมากกว่าพริกสีเขียว โดยพริกดิบที่มีสีเขียว

ในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลา พบว่ามีสารสีที่สำคัญคือสาร Chrophyll a และ b ซึ่งเป็นรงควัตถุที่ให้สีเขียวและสีเหลืองส้ม ได้แก่ ลูเทอิน (Lutein) บีตาแคโรทีน (β-carotene) ไวโอลาแซนทิน (Violaxanthin) แคปโซรูบิน (Capsorubin) และคริปโตแซนทิน (Cryptoxanthin) (จงรักษ์, 2556; อัจฉรา, 2548) เมื่อนำไปผ่านการทอดจึงเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวคล้ำ เนื่องจากเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนในโปรตีนกับหมู่คาร์บอนิลในน้ำตาล หรือเรียกว่า ปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) (พรพิมล, 2553; นิธิยา, 2544)

ด้านกลิ่นรส พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูสีเขียวผสมพริกชี้หนูสีแดง อัตราส่วน 1:1 มีคะแนนความชอบด้านกลิ่นรสสูงสุด รองลงมาได้แก่ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูสีแดง และพริกชี้หนูสีเขียว ตามลำดับ ซึ่งมีคะแนนความชอบด้านกลิ่น เท่ากับ 8.10 7.50 และ 7.20 ตามลำดับ โดยพริกชี้หนูจะมีกลิ่นรสเฉพาะตัว คือ กลิ่นฉุน กลิ่นหอม กลิ่นเปรี้ยว กลิ่นฉุน หรือบางครั้งเรียกว่ากลิ่นเผ็ดร้อน ลักษณะทั่วไปของกลิ่นพริกชี้หนูมาจากสาร Alkyl vanillylamides หรือที่เรียกว่า Capsaicinoids พบในพริกสกุล Capsicum และพริกเผ็ดในสายพันธุ์ *Apsicumannuum*, *Capsicum frutescens* และ *Capsicum chinensise* ซึ่งมีกลิ่นฉุนจัด

(อัจฉรา, 2548) นอกจากนี้พริกยังมีน้ำมันหอมระเหยที่เรียกว่า โอลีโอเรซิน (Oleoresin) เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของพริก (พัชรินทร์, 2547; พันธุ์ทิพย์, 2547) ซึ่งกลิ่นรสเฉพาะตัวดังกล่าวมีปริมาณสูงสุดในพริกที่ยังไม่แก่ที่มีสีเขียว และมีปริมาณลดลงเมื่อพริกสุกและมีสีแดง ดังนั้นผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูผสมระหว่างสีเขียวและสีแดงจึงมีระดับของกลิ่นรสเฉพาะตัวของพริกขี้หนูที่เหมาะสม ส่วนในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่เติมพริกสีเขียวมีกลิ่นรสเฉพาะตัวที่เข้มมากเกินไป ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกสีแดงอาจมีกลิ่นรสเฉพาะตัวที่อ่อนเกินไปเช่นกัน

ด้านความเผ็ด พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูสีแดงผสมพริกขี้หนูสีเขียว อัตราส่วน 1:1 มีคะแนนความชอบด้านความเผ็ดสูงสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูสีแดงและพริกขี้หนูสีเขียว ตามลำดับ ซึ่งมีคะแนนความชอบด้านความเผ็ด เท่ากับ 8.03 7.40 และ 7.37 ตามลำดับ โดยพริกขี้หนูมีสารแคปไซซินทำให้เกิดความเผ็ดและเป็นตัวการเพิ่มรสชาติจัดเป็นสารพวกฟีนอลิกเอไมด์ (Phenolic amide) ซึ่งประกอบด้วยสารต่างๆคือ แคปไซซิน (Capsaicin) ไดไฮโดรแคปไซซิน (Dihydrocapsaicin) นอร์ไดไฮโดรแคปไซซิน (Nordihydrocapsaicin) โฮโมแคปไซซิน (Homocapsaicin) และโฮโมไดไฮโดรแคปไซซิน (Homodihydrocapsaicin) ซึ่งแคปไซซินเป็นสารให้ความเผ็ดที่พบสูงถึงร้อยละ 46 - 47 ของสารที่สกัดได้จากพริกสด (พัชรินทร์, 2547; ประเสริฐ, 2544) โดยพริกขี้หนูผลดิบสีเขียวมีปริมาณแคปไซซิน 0.00395 กรัมหรือร้อยละ 0.79 เมื่อพริกสุกมีสีแดงมีปริมาณ

แคปไซซิน 0.0234 กรัม หรือร้อยละ 4.68 ซึ่งในพริกขี้หนูมีปริมาณแคปไซซินเพิ่มขึ้นตามระยะการสุกของผลพริก (วีรศิลป์ และคณะ, 2555) โดยผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูสีเขียวและสีแดงผสมกันมีสารให้ความเผ็ดในระดับเหมาะสม ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูสีเขียวและสีแดงอาจมีสารให้ความเผ็ดในระดับน้อยหรือมากเกินไปตามลำดับ

ด้านความชอบรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูผสมระหว่างสีแดงและสีเขียว มีคะแนนความชอบรวมสูงสุด รองลงมาได้แก่ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูสีแดงและสีเขียว ตามลำดับ ซึ่งมีคะแนนความชอบรวม เท่ากับ 8.17 7.87 และ 7.47 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูสีแดงผสมพริกขี้หนูสีเขียว อัตราส่วน 1:1 มีคะแนนความชอบด้านกลิ่นรส และความเผ็ดสูงสุด ดังนั้น จึงเลือกผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกขี้หนูสีแดงผสมพริกขี้หนูสีเขียว อัตราส่วน 1:1 เป็นสูตรพัฒนา เพื่อทำการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

2. ศึกษาปริมาณพริกขี้หนูที่เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลารสพริกขี้หนู

ทำการศึกษาผลของปริมาณพริกขี้หนูในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาต่อคุณลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้

2.1 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกขี้หนู

การศึกษาปริมาณพริกขี้หนูในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่ร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ทำการทดสอบการ

ยอมรับด้วยมาตราความชอบ 9 คะแนน (9-point-Hedonic scale) พบว่า ปริมาณพริกชี้หนูมีผลต่อคะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส ความเผ็ด และความชอบรวมทางสถิติ ($P<0.05$) ดังตารางที่ 4

ด้านสีและลักษณะปรากฏ พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูที่ระดับร้อยละ 3 จะมีคะแนนความชอบด้านสีและลักษณะปรากฏสูงกว่าผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูที่ระดับร้อยละ 2 2.5 3.5 และ 4 เนื่องจากมีปริมาณของพริกสีเขียวและแดงที่เหมาะสม ซึ่งผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูที่ระดับร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดมีคะแนนความชอบด้านสี เท่ากับ 6.87 7.07 7.50 6.83 และ 7.20 ตามลำดับและมีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ เท่ากับ 6.87 7.10 7.67 7.33 และ 7.20 ตามลำดับ

ด้านกลิ่นรส พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูที่ระดับร้อยละ 3 จะมีคะแนนความชอบด้านกลิ่นรสสูงกว่าผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูที่ระดับ

ร้อยละ 2 2.5 3.5 และ 4 เนื่องจากมีปริมาณของพริกสีเขียวและแดงที่เหมาะสม ซึ่งผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูที่ระดับร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดมีคะแนนความชอบด้านกลิ่นรส เท่ากับ 6.90 7.43 7.77 7.37 และ 7.23 ตามลำดับ

ด้านความเผ็ด พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูที่ระดับร้อยละ 3 มีคะแนนความชอบด้านความเผ็ดสูงกว่าผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูที่ระดับร้อยละ 2 2.5 3.5 และ 4 ทั้งนี้เนื่องจากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเผ็ดในระดับเหมาะสม ซึ่งการเติมพริกชี้หนูในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่เพิ่มขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเผ็ดเพิ่มสูงขึ้น หากเติมพริกชี้หนูในปริมาณร้อยละ 3.5 และ 4 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเผ็ดมากเกินไป โดยผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกที่ระดับร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด มีคะแนนความชอบด้านความเผ็ด เท่ากับ 6.73 6.73 7.57 7.30 และ 7.03 ตามลำดับ

ตารางที่ 4 คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูในปริมาณพริกชี้หนูที่ระดับต่างๆ

ปริมาณพริกชี้หนู (ร้อยละ)	สี	ลักษณะปรากฏ	กลิ่นรส	ความเผ็ด	ความชอบรวม
2	6.87 ^a ±0.90	6.87 ^a ±0.97	6.90 ^a ±1.06	6.73 ^a ±0.91	7.03 ^a ±0.89
2.5	7.07 ^{ab} ±0.94	7.10 ^a ±0.96	7.43 ^{bc} ±1.07	6.73 ^a ±0.91	7.50 ^{ab} ±1.14
3	7.50 ^b ±1.01	7.67 ^b ±0.88	7.77 ^c ±0.90	7.57 ^c ±1.07	7.80 ^b ±1.13
3.5	6.83 ^a ±0.87	7.33 ^{ab} ±0.92	7.37 ^{abc} ±0.96	7.30 ^{bc} ±1.06	7.27 ^{ab} ±1.26
4	7.20 ^{ab} ±0.96	7.20 ^{ab} ±1.06	7.23 ^{ab} ±0.97	7.03 ^{ab} ±1.07	7.17 ^a ±1.02

หมายเหตุ ^{a-b-c} ตัวเลขที่มีตัวอักษรกำกับแตกต่างกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ ($P<0.05$)

ด้านความชอบรวม พบว่า ผลผลิตแห้งหัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูปริมาณร้อยละ 3 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคะแนนความชอบสูงสุด เนื่องจากมีคะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่นรสและความเผ็ดสูงสุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีน้ำตาล มีชิ้นพริกชี้หนูกระจายตัวในปริมาณที่เหมาะสม มีกลิ่นรสและความเผ็ดของพริกชี้หนูที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเลือกผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมปริมาณพริกชี้หนูร้อยละ 3 เป็นสูตรพัฒนา ดังภาพที่ 1 เพื่อทำการศึกษานำข้อต่อไป


2.2 คุณภาพทางกายภาพ

ทำการศึกษาคูณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู ด้วยการวัดค่าการพองตัวโดยการใช้น้ำหนักการแทนที่ของเมล็ดงา การขยายตัวด้านกว้าง และการขยายตัวด้านยาว ได้ผลดังตารางที่ 5 ดังนี้

2.2.1 การพองตัวการขยายตัวด้านกว้างและการขยายตัวด้านยาว

การศึกษาคูณภาพผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมปริมาณพริกชี้หนูที่ระดับร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ต่อค่าการพองตัว การขยายตัวด้านกว้างและการขยายตัวด้านยาว พบว่า ปริมาณพริก

ชี้หนูไม่มีผลต่อค่าการพองตัว และการขยายตัวด้านยาว ($P \geq 0.05$) แต่มีผลต่อค่าการขยายตัวด้านกว้าง ($P < 0.05$) ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูทั้ง 5 ระดับ มีค่าการพองตัวระหว่าง 1.32-1.56 เท่าค่าการขยายตัวด้านกว้างระหว่าง 1.14-1.22 เท่า และค่าการขยายตัวด้านยาวระหว่าง 0.99-1.00 เท่า โดยองค์ประกอบที่มีผลต่อการฟูกรอบของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบโดยทั่วไป



ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูสูตรพัฒนา (ก) หัวข้าวเกรียบปลา ก่อนทอด (ข) หัวข้าวเกรียบปลา หลังทอด

ตารางที่ 5 ผลของปริมาณพริกชี้หนูต่อค่าการพองตัว การขยายตัวด้านกว้าง และการขยายตัวด้านยาวของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

ปริมาณพริกชี้หนู (ร้อยละ)	ปริมาณปลา (ร้อยละ)	การพองตัว (เท่า)	การขยายตัวด้านกว้าง (เท่า)	การขยายตัวด้านยาว (เท่า)
2	61.00	1.33 ^a ±0.43	1.15 ^{ab} ±0.05	0.99 ^a ±0.01
2.5	60.50	1.45 ^a ±0.58	1.14 ^a ±0.05	1.00 ^a ±0.02
3	60.00	1.35 ^a ±0.59	1.19 ^{bc} ±0.09	0.99 ^a ±0.01
3.5	59.50	1.32 ^a ±0.55	1.18 ^{abc} ±0.08	0.99 ^a ±0.02
4	59.00	1.56 ^a ±0.63	1.22 ^c ±0.07	1.00 ^a ±0.01

หมายเหตุ ^{a-b-c} ตัวเลขที่มีตัวอักษรกำกับแตกต่างกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ ($P < 0.05$)


คือ แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีปริมาณอะไมโลส ร้อยละ 17 และมีอะไมโลเพกตินร้อยละ 83 โดย น้ำหนักแห้ง (Tongdang *et al.*, 2008; จันทร์เพ็ญ, 2550) แป้งที่มีปริมาณอะไมโลเพกตินสูงทำให้ได้ แป้งผสมที่มีเจลเหนียว ยืดหยุ่นสูง หากมีการเติม แป้งมันสำปะหลังในปริมาณมากทำให้ผลิตภัณฑ์ หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการพองตัวดี กรอบและเปราะ ง่าย (จันทร์เพ็ญ, 2550; นาฎยา และ นูริฮาน, 2551; Tongdang *et al.*, 2008) โดยผลิตภัณฑ์หัว ข้าวเกรียบปลาที่พองตัวดี มีการเติมแป้งมัน สำปะหลังเพียงร้อยละ 30.5 แต่มีการเติมเนื้อปลา ทุแขกและพริกชี้หนุรวมกันร้อยละ 63 (ปลาทุ แขกร้อยละ 60 และพริกชี้หนุร้อยละ 3) ซึ่ง ส่วนประกอบของปลาและพริกชี้หนุล้วนเป็น องค์ประกอบที่ขัดขวางการพองตัวและขยายตัว ของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลา (เพลินใจ, 2546; Nurul *et al.*, 2010; Yu *et al.*, 1981) จึงทำให้

ผลิตภัณฑ์มีการพองตัวและขยายตัวไม่มากนัก ได้ ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะตัว คือ กรอบนอก และนุ่มใน

2.2.2 ค่าสี

จากการวิเคราะห์ค่าสีของผลิตภัณฑ์หัว ข้าวเกรียบปลาที่พองตัวด้วยระบบ Hunter lab ซึ่งจะทำการวัดค่าสีออกมา 3 ค่า คือ ค่า L* a* และ b* โดยค่า L* หมายถึง ค่าความสว่างที่ 0 คือ สว่างน้อย และ 100 คือ สว่างมาก ส่วนค่า a* หมายถึงค่าสีแดง (ค่า a* เป็นบวก) และสีเขียว (ค่า a* เป็นลบ) ค่า b* หมายถึงสีเหลือง (ค่า b* เป็นบวก) และสีน้ำเงิน (ค่า b* เป็นลบ) ได้ผล ดังนี้

ค่า L* การศึกษาค่าสีของผลิตภัณฑ์หัว ข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนุทั้ง 5 ระดับ ต่อค่า L* ของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาทั้ง ก่อนและหลังทอด ดังภาพที่ 2 พบว่า ปริมาณ



ภาพที่ 2 ค่า L* ของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมปริมาณพริกชี้หนุที่ระดับต่างๆ ก่อนทอด และหลังทอด


หมายเหตุ^{a-b} กราฟค่า L* ของหัวข้าวเกรียบปลาที่พองตัวก่อนทอด และค่า L* ของหัวข้าวเกรียบ ปลาที่พองตัวหลังทอดที่มีตัวอักษรกำกับต่างกัน ในปริมาณพริกชี้หนุที่เท่ากัน แสดง ความแตกต่างกันทางสถิติ ($P < 0.05$)

พริกชี้หนุ่มีผลต่อค่า L^* ของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่ก่อนทอด ($P < 0.05$) โดยเมื่อมีการเติมพริกชี้หนุ่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า L^* ลดลง แต่ปริมาณพริกชี้หนุ่ไม่มีผล ค่า L^* ในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาหลังทอด ($P \geq 0.05$) โดยผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่ก่อนทอดมีค่า L^* ระหว่าง 40.78 - 43.28 และเมื่อนำไปผ่านกระบวนการทอดทำให้ค่า L^* ลดลงโดยมีค่าระหว่าง 35.12 - 36.09 ดังภาพที่ 2 เนื่องจากผลิตภัณฑ์เมื่อผ่านการทอดมีสีน้ำตาลคล้ำมากขึ้นจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ซึ่งปฏิกิริยานี้เกิดจากกรดอะมิโนหรือกลุ่มกรดอะมิโนของโปรตีนและเปปไทด์ทำปฏิกิริยากับน้ำตาลรีดิวซ์ซิ่ง (กลูโคสหรือฟรุกโตส) โดยปฏิกิริยานี้จะเกิดอย่างรวดเร็วในกระบวนการทอดทำให้เกิดองค์ประกอบสีน้ำตาล (Brown-colored macromolecular melanoidins) ขึ้นในผลิตภัณฑ์และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิมากกว่า 150

องศาเซลเซียส (นุช, 2545)

ค่า a^* ผลของการเติมพริกชี้หนุ่ที่ระดับร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาทั้ง 5 ระดับ พบว่า ปริมาณพริกชี้หนุ่ไม่มีผลต่อค่า a^* ในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาทั้งก่อนและหลังทอด ($P \geq 0.05$) ดังภาพที่ 3 โดยผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่ก่อนทอดมีค่า a^* ระหว่าง 4.84-5.82 และเมื่อผ่านกระบวนการทอดผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลามีค่า a^* ระหว่าง 6.84-7.98 หรือผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มมีสีแดงเพิ่มขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลหรือปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) (Bouchon *et al.*, 2001)

ค่า b^* ผลของการเติมพริกชี้หนุ่ที่ระดับร้อยละ 2 2.5 3 3.5 และ 4 ในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาทั้ง 5 ระดับ พบว่า ปริมาณพริกชี้หนุ่มีผลต่อค่า b^* ในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาทั้งก่อนและหลังทอด ($P < 0.05$) ดังภาพที่ 4




ภาพที่ 3 ค่า a^* ของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมปริมาณพริกชี้หนุ่ที่ระดับต่างๆ ก่อนทอด และหลังทอด

หมายเหตุ ^{a-b} กราฟค่า a^* ของหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนุ่ก่อนทอด และค่า a^* ของหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนุ่หลังทอดที่มีตัวอักษรกำกับต่างกัน ในปริมาณพริกชี้หนุ่ที่เท่ากัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ ($P < 0.05$)

การเติมปริมาณ ฟริกจีหนู ในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาก่อนทอดที่เพิ่มขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า b^* เพิ่มขึ้น โดย ค่า b^* จะอยู่ในระหว่าง 15.09-15.97 และการเติมปริมาณฟริกจีหนูในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาหลังทอดทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า b^* ลดลง เนื่องจากชั้นของฟริกจีหนูเมื่อผ่านการทอดกลายเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มมากขึ้น โดยค่า b^* จะอยู่ในระหว่าง 16.19-17.57 ส่วนผลของการทอด พบว่า การนำผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาผ่านการทอดทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า b^* ที่เพิ่มขึ้น หรือผลิตภัณฑ์มีสีเหลืองเข้มขึ้นจากการออกซิเดชันของไขมันทำให้น้ำมันมีสีคล้ำลง เมื่อชั้นผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำมันเข้าไปจะทำให้สีของชั้นผลิตภัณฑ์มีสีเหลืองมากยิ่งขึ้น (วารวิชนี, 2551) และจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction)

3. ศึกษาลักษณะรูปร่างของชั้นฟริกจีหนูที่เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลา

การศึกษาลักษณะรูปร่างของชั้นฟริกจีหนูที่เหมาะสมในการผลิตหัวข้าวเกรียบปลารสฟริกจีหนู 3 ลักษณะ คือ บดละเอียดหั่นเป็นแว่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ความหนา 0.3 เซนติเมตร และหั่นเป็นเส้นขนาดกว้าง 0.2 เซนติเมตร × ยาว 1.5 เซนติเมตร แล้วนำหัวข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภคน้ำที่มีการเติมฟริกจีหนู 3 ลักษณะมาทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีเรียงลำดับความชอบ (Ranking test) ใช้ผู้ทดสอบชิม 30 คน พบว่า หัวข้าวเกรียบปลาที่มีลักษณะรูปร่างของชั้นฟริกจีหนูทั้ง 3 ลักษณะมีลำดับความชอบทางประสาทสัมผัสที่ไม่แตกต่างกัน ($P \geq 0.05$) แต่มีแนวโน้มว่าฟริกจีหนูที่หั่นเป็นแว่น จะได้รับความชอบสูงกว่าแบบบดละเอียดและ



ภาพที่ 4 ค่า b^* ของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมปริมาณฟริกจีหนูที่ระดับต่างๆ ก่อนทอด และหลังทอด

หมายเหตุ ^{a-b} กราฟค่า b^* ของหัวข้าวเกรียบปลารสฟริกจีหนูก่อนทอด และค่า b^* ของหัวข้าวเกรียบปลารสฟริกจีหนูหลังทอดที่มีตัวอักษรกำกับต่างกัน ในปริมาณฟริกจีหนูที่เท่ากัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ ($P < 0.05$)

แบบหั่นเป็นเส้น (ดังตารางที่ 6) จึงคัดเลือกพริก
ชี้หนูแบบหั่นเป็นแว่นไปใช้ในการผลิตหัว
ข้าวเกรียบปลาในขั้นตอนต่อไป

4. ศึกษาคุณภาพของหัวข้าวเกรียบปลารสพริก ชี้หนู

นำผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริก
ชี้หนูสูตรพัฒนาพร้อมบริโภคมาทำการวิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าแรงเฉือน
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น
โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และแคลเซียม และ

เปรียบเทียบกับหัวข้าวเกรียบปลาสูตรพื้นฐาน ซึ่ง
หัวข้าวเกรียบปลาสูตรพื้นฐานมีส่วนประกอบ คือ
ปลาทูแวก แป้งมันสำปะหลัง เกลือป่น ผงชูรส
และน้ำตาลทรายเท่ากับร้อยละ 63 30.5 1.8 0.9
และ 3.8 เมื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัว
ข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูได้มีการใช้พริกชี้หนู
ทดแทนเนื้อปลาปริมาณร้อยละ 3 ได้ผลดังตาราง
ที่ 7 ดังนี้

4.1 คุณลักษณะทางกายภาพ

ค่าแรงเฉือน

แรงเฉือน (Shear force) หมายถึง การวัด

ตารางที่ 6 การทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบเรียงลำดับความชอบ (Ranking test) ของผลิตภัณฑ์
หัวข้าวเกรียบปลาที่มีการเติมพริกชี้หนูลักษณะต่างๆ

คะแนนทดสอบชิม	รูปร่างของชิ้นพริกชี้หนูในผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลา		
	บดละเอียด	หั่นเป็นแว่น	หั่นเป็นเส้น
คะแนนอันดับความชอบรวม	60	58	62
คะแนนระดับความชอบเฉลี่ย*	2.00 ^a	1.93 ^a	2.07 ^a

หมายเหตุ 1 หมายถึง ลำดับความชอบอันดับ 1 และ 5 หมายถึงลำดับความชอบอันดับ 5

* คะแนนลำดับความชอบรวมที่มีอักษรต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 7 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลา	หัวข้าวเกรียบปลา รสพริกชี้หนู	หัวข้าวเกรียบปลา สูตรพื้นฐาน ¹
ทางกายภาพ		
ค่าแรงเฉือน (Shear force) (กรัม)	4,064±0.43	3,777.96
ทางเคมี		
ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)	34.69±0.28	17.42±1.58
ปริมาณโปรตีน (ร้อยละ)	15.21±0.05	17.09±0.58
ปริมาณไขมัน (ร้อยละ)	7.67±0.01	8.91±0.05
ปริมาณเถ้า (ร้อยละ)	3.14±0.07	4.42±1.52
ปริมาณใยอาหาร (ร้อยละ)	6.64±0.03	NNA
ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	872.10	4,020.00

หมายเหตุ ¹ จากการศึกษาของ วิภาดา และ ภารดี (2554)

NNA หมายถึง ไม่ได้ทำการวิเคราะห์

ค่าแรงที่ทำให้ตัวอย่างเกิดการแยกตัวโดยการเลื่อนออกจากกัน (กัญญา, 2551) ซึ่งผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาสูตรพื้นฐานมีค่าแรงเลื่อนเท่ากับ 3,777.96 กรัม เมื่อมีการพัฒนาเป็นหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู โดยการเติมปริมาณพริกชี้หนูทดแทนเนื้อปลาร้อยละ 3 ทำให้ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีค่าแรงเลื่อนเพิ่มขึ้นโดยมีค่าเท่ากับ $4,064 \pm 0.43$ กรัม

4.2 องค์ประกอบทางเคมี

การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า และเยื่อใย เท่ากับร้อยละ 34.69 ± 0.28 15.21 ± 0.05 7.67 ± 0.01 3.14 ± 0.07 และ 6.64 ± 0.03 ตามลำดับ และปริมาณแคลเซียม 872.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ด้านความชื้น พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาสูตรพื้นฐานมีปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 17.42 ± 1.58 เมื่อมีการพัฒนาเป็นหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู โดยการเติมปริมาณพริกชี้หนูทดแทนเนื้อปลาร้อยละ 3 ทำให้ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีปริมาณความชื้นสูงขึ้นโดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 34.69 และผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีปริมาณความชื้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาจากงานวิจัยของ อรณุช (2545) ที่มีปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 2.60 ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีลักษณะผิวด้านนอกกรอบแข็ง แต่ส่วนเนื้อสัมผัสด้านในเหนียวและนุ่ม โดยความชื้นส่วนใหญ่ถูกเก็บที่ในเนื้อด้านในของชิ้นหัวข้าวเกรียบปลา ส่วนผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบโดยทั่วไปจะมีปริมาณความชื้นต่ำ เนื้อสัมผัสเป็นรูพรุน กรอบและความหนาแน่นต่ำ

ด้านปริมาณโปรตีน พบว่าผลิตภัณฑ์หัว

ข้าวเกรียบปลาสูตรพื้นฐานมีปริมาณโปรตีนเท่ากับร้อยละ 17.09 เมื่อมีการพัฒนาเป็นหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู โดยการเติมปริมาณพริกชี้หนูทดแทนเนื้อปลาร้อยละ 3 ทำให้ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีปริมาณโปรตีนลดลงโดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 15.21 แต่ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาจากงานวิจัยของเพลินใจ (2546) ที่มีการเติมเนื้อปลาปริมาณร้อยละ 35 และเป็นเนื้อปลาล้วนที่ไม่ก้างเป็นส่วนผสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโปรตีนเท่ากับร้อยละ 7.42 ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะฟู กรอบและมีความหนาแน่นต่ำ (Neiva *et al.*, 2011) และข้าวเกรียบปลาโดยทั่วไปไม่สามารถเติมเนื้อปลาได้ในปริมาณสูงเนื่องจากโปรตีนจะทำปฏิกิริยากับเม็ดแป้งส่งผลให้ความกรอบของข้าวเกรียบลดลง (Yu, 1991) และทำให้การพองตัวของข้าวเกรียบลดลง (เพลินใจ, 2546)

ด้านปริมาณเยื่อใยและแคลเซียม พบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูมีปริมาณเยื่อใยร้อยละ 6.64 ส่วนปริมาณแคลเซียมพบว่า ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลาสูตรพื้นฐานมีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 4,020 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเมื่อมีการพัฒนาเป็นหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู โดยการเติมปริมาณพริกชี้หนูทดแทนเนื้อปลาร้อยละ 3 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณแคลเซียมน้อยลงโดยมีค่าเท่ากับ 872.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู มีการเติมพริกชี้หนูทดแทนเนื้อปลาในสูตรหัวข้าวเกรียบปลาสูตรพื้นฐาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสชาติดังกล่าวมีปริมาณแคลเซียมลดลงจากสูตรพื้นฐาน โดยแคลเซียมจัดเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อคนทุกเพศทุกวัย ในวัยเด็กอายุตั้งแต่ 4 -

8 ปี ต้องการปริมาณแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 9 - 18 ปี ต้องการปริมาณแคลเซียม 1,300 มิลลิกรัมต่อวันวัยผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงและเพศชายอายุตั้งแต่ 31 - 50 ต้องการปริมาณแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน และวัยผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงและเพศชายอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ต้องการปริมาณแคลเซียม 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน (Houtkooper and Farrell, 2013; พัชรินทร์, 2554) โดยทั่วไปแคลเซียมนอกจากเป็นส่วนประกอบของกระดูกแล้วยังทำหน้าที่อื่นๆ อีกเช่นช่วยในการแข็งตัวของเลือดช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบประสาททำให้เกิดการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อทั่วไปรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจนอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของโปรตีนอื่นๆ ที่ช่วยในกระบวนการสร้างและสลายกระดูกและที่สำคัญแคลเซียมยังช่วยควบคุมความสมดุลของกรดในร่างกายอีกด้วย (วิศิษฐ์, 2556) ซึ่งการบริโภคอาหารของคนไทย พบว่า ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำ หากกินอาหารที่มีแคลเซียมต่ำเป็นเวลานานๆ ทำให้ร่างกายมีภาวะที่ได้รับแคลเซียมน้อย พาราไธรอยด์ฮอร์โมนจะส่งสัญญาณให้ไตสกัดกั้นแคลเซียมที่จะขับออกทางปัสสาวะเอาไว้ ในขณะที่เดียวกันจะปล่อยวิตามินดีที่สะสมอยู่ในตับออกมาใช้ ถ้าร่างกายยังได้รับแคลเซียมจากอาหารน้อยมาก วิตามินดีจะไปยึดเอาแคลเซียมจากกระดูกมาใช้เพื่อให้งานการทำงานของกล้ามเนื้อและประสาทให้เป็นไปอย่างปกติ ซึ่งจะทำให้เป็นตะคริวและชา เกิดการผิดปกติของการสร้างกระดูก และอาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน (กาญจนา, 2550) การเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมให้มากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูเป็นอาหารว่างนับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมี


ปริมาณโปรตีนและแคลเซียมสูงแล้ว ยังมีสรรพคุณด้านสมุนไพรจากพริกชี้หนู คือ สารแคปไซซิน ที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อลดการอุดตันของหลอดเลือด ลดปริมาณสารโคเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและยังช่วยเสริมสร้างอารมณ์สดชื่น (พัชรานี, 2547) จึงเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยรุ่น ที่ชอบรับประทานอาหารว่างหรืออาหารขบเคี้ยวมาก นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตดีตามวัยและมีภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโรคได้ดีวิธีหนึ่ง

5. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู

จากการศึกษายอมรับของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 200 คน (แบบไม่เจาะจง) พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นเพศชายร้อยละ 29 และเพศหญิงร้อยละ 71 โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.5 ซึ่งเป็นนักศึกษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58 และมีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.5 ด้านการยอมรับของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูสูตรพัฒนาในระดับความชอบปานกลางถึงชอบมากที่สุดรวมกันถึงร้อยละ 87 และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.70 ± 1.05 ดังภาพที่ 5

สรุปผลการศึกษา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนู โดยทำการศึกษาระดับความแก่ของ



ภาพที่ 5 ระดับการยอมรับหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูของผู้บริโภคทั่วไป

พริกชี้หนูพบว่า หัวข้าวเกรียบปลาที่มีส่วนผสมของพริกชี้หนูสีเขียวผสมพริกชี้หนูสีแดง อัตราส่วน 1:1 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคะแนนความชอบรวมสูงสุด เนื่องจากมีคะแนนความชอบ ด้านกลิ่นรส และ ความเผ็ดสูงสุด และทำการศึกษาปริมาณพริกชี้หนูในผลิตภัณฑ์ หัวข้าวเกรียบ พบว่า พริกชี้หนูปริมาณร้อยละ 3 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคะแนนความชอบสูงสุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีน้ำตาล มีกลิ่นพริกชี้หนูกระจายตัวในปริมาณที่เหมาะสม มีกลิ่นรสและความเผ็ดของพริกชี้หนูที่เหมาะสม จากนั้นทำการศึกษาลักษณะรูปร่างของชิ้นพริกชี้หนูพบว่า ลักษณะรูปร่างของชิ้นพริกชี้หนูทำให้ผลิตภัณฑ์มีลำดับความชอบทางประสาทสัมผัสที่ไม่แตกต่างกัน ($P \geq 0.05$) แต่มีแนวโน้มว่าผลิตภัณฑ์ที่เดิมพริกชี้หนูที่หั่นเป็นแว่น จะได้รับคะแนนความชอบสูงสุด การสำรวจการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 87 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมากที่สุด และมีคะแนน

ความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.70 ± 1.05 คุณลักษณะของหัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูสูตรพัฒนา คือ มีค่าแรงเหนียวเท่ากับ 4,064 กรัม ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า และเยื่อใย ร้อยละ 34.69 15.21 7.67 3.14 และ 6.64 ตามลำดับ และปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 872.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกชี้หนูและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถวางจำหน่ายได้เป็นเวลานาน

เอกสารอ้างอิง

กัญญา ศรีสุข. 2551. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแห้ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 กาญจนา รักภักดี และ ชัยวัฒนา ประภาศรี. 2550. รายงานการวิจัยการวิเคราะห์หาปริมาณ

- โปรตีน แคลเซียมและไขมันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเต้าหอยนมสดบรรจุขวดพลาสติก. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม.
- จรงค์ แก้วประสิทธิ์. 2556. **พริก (Chili) ตอนที่ 8.** พริก. แหล่งที่มา: http://library.uru.ac.th/webdb/images/charpa_chili_3.html, 19 เมษายน 2556.
- จันทร์เพ็ญ ไชยน้อย. 2550. ผลของคุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งผสม (แป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคุ) ต่อคุณภาพของข้าวเกรียบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- นาฎยา แผละหมัด และ นูริฮาน สาและ. 2551. รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา (kerepok) จากการใช้ปลาหยองเป็นวัตถุดิบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา.
- นิธิยา รัตนาปนนท์. 2544. **หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น.** โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
- นุช ผลนาถ. 2545. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการทอด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ประเสริฐ ประภานภินธุ์. 2544. เปรียบเทียบเทคนิคการสกัดสารแคปไซซินในพริกพันธุ์ต่างๆ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- พรพิมล ม่วงไทย. 2553. เคมีของการเกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด. **วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2(4): 1-9.**
- พัชรินทร์ ชนะพาน์. 2554. โรคกระดูกพรุนในเพศชาย ร้ายแรงกว่าที่คิด. **วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 41(3): 283-294.**
- พัชรินทร์ ฟองคำ. 2547. ผลของพริกชี้หนูปนต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พัชราณี ภัวตกุล. 2547. พริกชี้หนูป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด. **หมอชาวบ้าน 26(305): 17-29.**
- พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง. 2547. ลักษณะทางกายภาพ ปริมาณ oleoresin และความเผ็ดของพริก. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เพลินใจ ดังคณะกุล. 2546. สารพัดสารพันข้าวเกรียบ. **วารสารอาหาร 33(3): 162-167.**
- วารวิชนี ลอปกุลเกียรติ. 2551. ผลของปัจจัยในการทอดและการผลิตเพดเลตโดยชื่อกระบวนการเอ็กซ์ทราซันต่อคุณสมบัติของขนมขบเคี้ยวหลังทอด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- วิภาดา มุรินทร์นพมาศ และ ภารดี พลไชย. 2554. รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ : หัวข้าวเกรียบ (पालอ- กรือไประ). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, จังหวัดยะลา.
- วีรศิลป์ สอนจรรยา, สุมน มาสุชน, พรพรรณ พรศิลป์ และ เสาวณี สาธวิริยะพงศ์. 2555. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบและปริมาณแคปไซซินของพริกชี้หนูสวนและพริกกะเหรี่ยง (*Capsicum frutescens* L.). **วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 4(ฉบับพิเศษ): 57-67.**
- วิศิษฐ์ วามวาณิชย์. 2556. **แคลเซียมช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน.** Siriraj E-Public Library. แหล่งที่มา: <http://WWW.si.mahidol.ac.th/>

- sidocor/e-pl/article/detail.asp?id=155, 14 มีนาคม 2555.
- อัจฉรา ทักนิษะมณี. 2548. ผลของการลดอุณหภูมิและภาชนะบรรจุต่อคุณภาพของพริกขี้หนูพันธุ์ซูปเปอร์ฮอด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- อรนุช สีหามาลา. 2545. การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- AOAC. 1999. **Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists. 16thed.** The Association of Official Analytical Chemists, Inc., Washington, DC.
- AOAC. 2000. **Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists. 16thed.** The Association of Official Analytical Chemists, Inc., Washington, DC.
- Bouchon, P., Hollins, P., Pearson, M., Pyle, D.L. and Tobin, M.J. 2001. Oil distribution in fried potatoes monitored by infrared microspectroscopy. **Journal of Food Science** 66(7): 918-923.
- Fisher, R.A. and Yates, F. 1942. **Statistical tables for biological, agricultural and medical research (2rded).** Oliver and body, Edinburgh.
- Houtkoper, L. and Farrell, V.A. 2013. **Calcium Supplement Guidelines.** Arizona Cooperative Extension. Available Source: <http://ag.arizona.edu/pubs/health/az1042>, May 25, 2013.
- Neiva, C.R.P., Machado, T.M., Tomita, R.Y., Furlan, E.F., Lemos Neto, M.J. and Bastos, D.H.M. 2011. Fish crackers development from minced fish and starch: an innovative approach to a traditional product. **Ciênc Tecnol Aliment Campinas** 31(4): 973-979.
- Nurul, H., Ang, L.L., Chung, X.Y. and Herpandi. 2010. Chemical composition, colour and linearexpansion properties of malaysian commercial fish cracker (keropok). **Asian Journal of Food and Agro-Industry** 3(05): 473-482.
- Martz, S.A. 1984. **Snack Food Technology (2rded.).** AVI Publishing, Westport.
- Mohamed, A., Jamilah, B., Abbas, K.A., Abdul Rahman, R. and Roselina, K. 2008. A review on physicochemical and thermorheological properties of sago starch. **American Journal of Agricultural and Biological Sciences** 3(4): 639-646.
- Tongdang, T., Meenun, M. and Chainui, J. 2008. Effect of sago starch addition and steaming time on making cassava cracker (keropok). **Starch/Stärke** 60(10): 568-576.
- Yu, S.Y., Mitchell, J.R. and Abdullah, A. 1981. Production and Acceptability Testing of Fish Cracker (‘keropok’) Prepared by the Extrusion Method. **Food Technology** 16: 51-58.
- Yu, S.Y. 1991. Acceptability of fish crackers (keropok) made from different type of flour. **Asean Food Journal** 6(3): 114-116.